

ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА

**ДОЛЯ СЛУЧАЕВ СМЕРТЕЙ,
СВЯЗАННЫХ С АЛКОГОЛЕМ, СРЕДИ
МУЖЧИН СОСТАВЛЯЕТ 7,7% , СРЕДИ
ЖЕНЩИН - 2,6%.**

***ВО ВСЕМ МИРЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВРЕДНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
ЕЖЕГОДНО УМИРАЮТ 3 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 5,3%
ВСЕХ СЛУЧАЕВ СМЕРТЕЙ.**

**УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ
БОЛЕЕ ЧЕМ 200 ЗАБОЛЕВАНИЙ, ТРАВМ, А ТАКЖЕ
ДРУГИХ НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ. УПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЯ СВЯЗАНО С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ТАКИХ
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ, КАК ПСИХИЧЕСКИЕ И
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ВКЛЮЧАЯ
АЛКОГОЛЬНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ, И ТЯЖЕЛЫЕ
НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТАКИЕ КАК
ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ, НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ РАКА И
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ**



**ТРЕЗВОСТЬ ВЫБОР
СИЛЬНЫХ**

**БЕЛАРУСЬ В ПОСЛЕДНЕМ ОТЧЕТЕ ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОКАЗАЛАСЬ НА 27-М МЕСТЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ
АЛКОГОЛЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ.**

**ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ ЗА 2020 ГОД
КАЖДЫЙ БЕЛОРУС (СТАРШЕ 15 ЛЕТ)
УПОТРЕБИЛ БОЛЬШЕ 10 ЛИТРОВ АЛКОГОЛЯ
ЗА ГОД.**

ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

Согласно требованиям п. 1 ч. 2 ст. 49 ТК работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, наниматель обязан отстранить от работы. При этом не имеет значение, в какое время рабочего дня (смены) работник появился в таком состоянии.

*Наниматель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником, появившимся на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на основании п. 7 ст. 42 ТК.

СИМПТОМЫ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ:

- Запой;
- Отсутствие реакции организма на алкоголь, он уже не отторгается. Нет тошноты и рвоты даже после приёма внушительной дозы;
- Похмельный синдром. Неприятные ощущения на следующее утро, вызванные интоксикацией организма этанолом;
- Изменение внешнего вида. Пьющий человек быстрее стареет. Кожа становится дряблой, белки глаз желтеют, возникает ломкость ногтей, выпадают волосы;
- Агрессивность. Человек становится раздражительным. Отсутствие необходимой дозы лишает его здравого рассудка;
- Деградация личности. Именно это, по мнению организации ВОЗ, считается одним из основных симптомов последней стадии алкоголизма. Теряются любые интересы, кроме распития алкоголя. Человек становится асоциальным.

Алкоголь — это токсичное, психоактивное, вызывающее зависимость вещество, которое еще несколько десятилетий назад было классифицировано Международным агентством по изучению рака как канцерогенное вещество 1-ой группы; в эту группу входят наиболее опасные факторы риска, такие как асбест, радиация и табак.

Алкоголь является причиной по меньшей мере семи видов рака, в том числе наиболее распространенных, таких как колоректальный рак и рак молочной железы. риск развития рака существует при употреблении любых алкогольных напитков, независимо от их цены и качества.